

附件一、藥袋標示評比內容

■ 1分 代表該項目有標示 ▲ 0.5分 代表該項目有標示，但不理想 ★ 1.5分代表該項目有標示，且較其他醫療院所理想

第一部份：醫學中心

醫改會主張標示項目	台大	台北榮總	三總	馬偕	新光	國泰	林口長庚	台中榮總	中國醫藥	中山醫學	彰基	成大	奇美	高雄榮總	高醫	高雄長庚
■ 姓名	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
性別、年齡	▲	▲	▲				■	▲		■		▲	▲	▲		■
■ 藥品名稱（成分名） 中文化	■	★	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
藥廠（廠商）名																
■ 數量	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■ 天數、劑量	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■ 服用方法	■	■	★標出服用時間點	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■ 藥局地點、名稱	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
調劑者姓名	■	▲藥師代號	▲只有其中一個藥袋蓋章				■	■		值班藥師					■	■
■ 調劑年、月、日等資料	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
處方醫師姓名	■	■	■			■	▲代號	■		■			■	■		■

藥品保存方式		▲	▲		▲	▲	▲		▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲
調劑後有效期限	■藥品 製造日期、保存期限 在內部 小塑膠 藥袋	▲					去電 詢問									
適應症	■	■	■	■	■	■	■	■		■			■	■		
副作用		■														
警語(例如服用後不可開車等)		■					▲有藥袋標出 避免與酒精一起服用，但多數藥袋無警語	■		■		▲有藥袋標出 避免與酒精一起服用，但多數藥袋無警語				
其他	*複核藥師 *科別 *注意事項 *諮詢專線	*藥袋數 *諮詢專線	諮詢專線	*科別 *藥品 諮詢專線	電話	*藥袋數 *諮詢專線	*科別 *諮詢專線	*諮詢專線 *科別	*科別 *諮詢專線	*諮詢專線 *科別	*諮詢專線	*諮詢專線	*諮詢專線	*諮詢專線	*科別 *諮詢專線	*諮詢專線

註：藥品保存方式應使用避光避濕之藥瓶，因此即使藥袋印刷上直接標示「請置於乾燥陰涼處」仍只計 0.5 分

第二部分：區域醫院

醫改會	台安	仁愛	萬芳	北醫	振興	和信	署立台北醫院	童綜合	署立台南醫院
姓名	■	■	■	■	■	■	■	■	■
性別、年齡		▲		▲	▲		■	▲	■
藥品名稱（成分名）	■	■	■	■	■	■	■	■	■
藥廠（廠商）名									
數量	■	■	■	■	■	■	■	■	■
天數、劑量	■	■	■	■	■	■	■	■	■
服用方法	■	■	■	■	■	■	■	■	■
藥局地點、名稱	■	■	■	■	■	■	■	■	■
調劑者姓名	■						▲只有第一個藥袋有蓋		
調劑年、月、日等資料	■	■	■	■	■	■	■	■	■
處方醫師姓名	■		■		■		■	■	
藥品保存方式	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲
調劑後有效期限				▲					
適應症	■	▲作用：綜合感冒藥，不夠具體。	■	■	■	■			★標示非常清楚
副作用									
警語			▲	▲	▲		▲服感冒藥後請多休息勿操作機械、開車	▲有藥袋標示整粒吞服、不可與含酒精之	

								(所有藥袋都標示)	飲料並用，但多數藥袋無警語	
其他	*科別 *諮詢專線	*諮詢專線 *90年9月之後的藥袋沒有，但90年8月之藥袋有標示:1.藥品名稱有標示藥的外觀 2.出生日期 3.其他注意事項(飯後、操作機械小心，避免與酒共服、整粒吞服)	*諮詢專線 *科別	*諮詢專線 *藥袋 key 印未對齊	*諮詢專線	*諮詢專線	*諮詢專線	*諮詢專線 *科別	*科別 *諮詢專線	*諮詢專線

第三部分：地區醫院

醫改會	宏 X	大 X	林 X	秀 X
姓名	■	■	■	■
性別、年齡			▲	■
藥品名稱（成分名）	■	■	■	■
藥廠（廠商）名				
數量	■	■	■	■
天數、劑量	■	■	■	■
服用方法	■	■	■	■
藥局地點、名稱	■	■	■	■
調劑者姓名				
調劑年、月、日等資料	■	■	■	■
處方醫師姓名			■	■
藥品保存方式	■		■	▲
調劑後有效期限				
適應症		■		■
副作用				
警語				
其他	*服藥指示		*科別 *諮詢專線	*胃藥請咬碎 *諮詢專線

第四部分：基層診所

醫改會	丞 X 耳鼻喉科	○ 耳鼻喉科	X 耳鼻喉科	亞 X 眼兒科	聯 X 內兒科	邱 X 內兒科	馮 X	慈 X	余 X 皮膚科	X 家醫科
姓名	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
性別、年齡	▲	▲				▲			▲	
藥品名稱（成分名）	■	■								
藥廠（廠商）名										
數量	■	■								
天數、劑量	■	■	■			■	■			
服用方法	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
藥局地點、名稱	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲只有電話
調劑者姓名	■									
調劑年、月、日等資料	■	■	▲只有年，未 寫月、日	■	▲未寫年	■	■	■	■	■
處方醫師姓名		■								
藥品保存方式										
調劑後有效期限										
適應症										
副作用										
警語										
其他	*請遵照醫 師藥師指示 服用、如有過 敏請告知醫	*就醫日期 *傷病名稱				*諮詢專線 *如症狀仍 明顯，宜再回 診追蹤				*諮詢專線

		師								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

註：藥品保存方式應使用避光避濕之藥瓶，因此即使藥袋印刷上直接標示「請置於乾燥陰涼處」仍只計 0.5 分

附件二、台灣規範藥品標示之相關法令一覽表

醫改會 期待藥瓶標明項目	醫師法	全民健康保險醫療辦法 第 45 條	藥事法第七十五條	優良藥品調劑作業規範 GDP
	醫師對於診治之病人交付藥劑時，應於容器或包裝上載明：	為保障對象用藥安全，藥劑之容器或包裝上應載明：	藥物之標籤、仿單或包裝，應依核准，分別刊載下列事項：	依據專業標準於藥品容器包裝上記明下列事項：
姓名	病人姓名	保險對象姓名		病患姓名
性別、年齡	性別	性別		
藥品名稱（成分名）中文化	藥名	藥品名稱	品名及許可證字號	藥品商品名
數量	數量	數量		藥品單位含量與數量
天數、劑量	劑量	天數、劑量		清楚的劑量
服用方法	用法	服用方法	主要成分含量、用量及用法	簡短的用藥指示
藥局地點、名稱	執業醫療機構名稱、地點	藥局地點、名稱		藥局之名稱、地址、電話號碼
調劑者姓名		調劑者姓名		
調劑年、月、日等資料	交付年、月、日	調劑年、月、日等資料。	製造日期或批號	處方編號及調劑日期
處方醫師姓名				處方醫師姓名
藥品保存方式				
調劑後有效期限			有效期間或保存期限	藥品效期(調劑後之藥品失效日期)
適應症			主治效能、性能或適應症	

	副作用			副作用、禁忌及其他注意事項	
	其他注意事項(例如服用後不可開車等)				
	藥廠(廠商)名			廠商名稱及地址	
				其他依規定應刊載事項	

附件三、美國藥瓶標示一覽表

醫改會 期待台灣藥瓶標示項目	美國藥瓶標示項目
	藥瓶特性：安全開關、防光、避濕（放入乾燥劑）。
姓名	病人姓名
性別、年齡	
藥品名稱（成分名）中文化	藥（商品）名、單位、劑型、成分名
數量	數量
天數或劑量	劑量
服用方法	服用方法
藥局地點、名稱	藥局名稱、電話、地址
調劑者姓名	調劑者姓名
調劑年、月、日等資料	給藥日期
處方醫師姓名	醫師名、地址
藥品保存方式	含在藥品說明書內 （註：美國隨同藥瓶，多會另附說明書記載更詳細之用藥資訊）
調劑後有效期限	有效期限
適應症	含在藥品說明書內
副作用	含在藥品說明書內
警語（例如服用後不可開車等）	警語
藥廠（廠商）名	含在藥品說明書內
	處方有效期限
	處方開立日期
	處方編號

舉例說明---以美國病人領得之處方用藥 Lipitor 藥瓶為例

Lipitor 10mg tab

藥（商品）名 單位 劑型

ATORVASTATIN CALCIUM

成分名

Refill 2 times before 07/18/2002

處方有效期限（註：此為慢性病連續處方箋）

Costco Pharmacy Department: (801) 851-5002

藥局名稱、電話

Wholesale Corp. Dea: BC6581044 RON REID

藥局所在之量販店名¹ 註冊碼 藥師名

648 EAST 800 SOUTH

OREM, UT 84097

USA

藥局地址

Orig: 07/18/2001

處方開立日期

Disp: 07/18/2001 RR/BB

給藥日期 藥師名/助理名

Dr. Baird, Ron

醫師名

884 E. Redford Dr.

Provo, UT

醫師地址

Whse# 484

RX# 122307

處方編號

McGhie, Alice

病人姓名

TAKE ONE TABLET BY MOUTH EVERYDAY

服用方法

QTY. 30

數量

DISCARD

AFTER 07/18/2002

有效期限

DO NOT EAT GRAPEFRUIT OR DRINK GRAPEFRUIT JUICE WITHIN 2 – 4 HOURS OF TAKING THIS MEDICATION

警語（服藥之後 2-4 小時內請勿吃葡萄柚或喝葡萄柚汁）

¹ 該藥局位在量販店內。

附件四、台灣民眾瞭解自己服用的藥品資訊會碰到哪些困難？

民眾要瞭解自己服用的藥品資訊，會碰到哪些阻礙？

- 一、無字天書：藥袋沒有標示藥名。
- 二、沈默是金：醫師（藥師）沒說或病人忘了問、不敢問（怕冒犯醫師權威）藥品資料。
- 三、糊成一團：藥袋標示模糊、醫師（藥師）說得模糊、病人記得模糊。
- 四、名偵探柯南也吃驚：查遍衛署、市政府網站，基本資訊仍不足。
 1. 網海茫茫何處查？
 2. 如何輸入正確的關鍵字？
 3. 相同品名之藥物一大串，沒有廠商名，無法確定吃的是哪一藥廠製造的藥品。
 4. 查到之資料仍沒有完整說明（缺少副作用、警語等）。

藥品網路查詢問題

政府資源浪費在建制類似的系統，但沒有一個功能齊全的系統。例如：

1. 同一藥品（Borraginol-n supp），台北市政府藥品查詢系統之說明包括副作用、警語等，但衛生署的藥品查詢系統就不包括。
2. 有的藥品（例如 Premelle）在台北市政府藥品查詢系統上無法查到，在衛生署的系統上卻可查到。

衛生署藥品許可證查詢系統

<http://websrv.doh.gov.tw/mdrug/>

台北市政府藥品查詢系統

<http://www.healthcity.net.tw/Med/Med.asp>

美國網路上的藥品查詢系統

<http://www.medlineplus.com/>

所查得知藥品資訊，在以下七大項目均會有詳細說明

Brand Names

Category

Description ·

Before Using This Medicine

Proper Use of This Medicine ·

Precautions While Using This Medicine ·

Side Effects of This Medicine

以 Lipitor（Atorvastatin）這項藥品為例，相關解說長達 A4 紙張 4 頁整。